


Météo de l'herbe du 3 octobre 2023

Chaleur et faibles croissances d'herbe.

La poursuite d'un temps estival sans précipitations notables entraîne une stagnation de la végétation. Les rotations entre les regains pâturés et les repousses au pâturage permettent d'assurer un minimum d'herbe dans la ration en cas d'accès suffisant à de grandes surfaces. Sinon l'affouragement en vert ou la distribution de foin à l'auge se poursuivent. Pensez à l'approche des vêlages aux transitions alimentaires, sans oublier la qualité de l'abreuvement.



Repères conduite du troupeau : 25 septembre au 2 octobre 2023

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait par vache (Kg/VL)	20,5	23,1	21,8	25,0	20,5	24,8
TB (g/Kg)	38,3	40,1	38,9	40,1	39,2	39,9
TP (g/Kg)	33,4	33,4	33,5	33,7	33,6	34,0
Coût total ration (€/1000 Kg de lait)	153,7	188,3	130,6	184,2	174,1	167,6
Coûts concentrés + mrx (€/1000 Kg de lait)	96,9	111,2	88,6	113,7	114,7	96,4
g concentrés / Kg de lait	235	247	198	249	269	241


Point de vue des éleveurs de la SCEA des Coteaux à Lavigny (290 mètres d'altitude)

« La dernière période de pâturage pour cette campagne est plutôt compliquée. Le troupeau est en ration hivernale depuis le 15 août avec 10 à 15kg de fourrages (2/3 foin et 1/3 regain) et complétement avec 3kg d'un mélange céréales-protéagineux à 16 de MAT et 500g de maïs.


Les prairies ont souffert pendant les chaleurs de fin d'été et l'eau tombée en septembre n'a pas permis de relancer la pousse de manière importante. Malgré un effet cumulatif de fin de lactation pour une bonne partie du troupeau, la production de lait du mois de septembre est bien inférieure à celle de l'année dernière. »

Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d'Agriculture du Jura.

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

